

# Lagosa®

Extracto de fruto de cardo mariano seco

Tabletas recubiertas

Vía de administración: Oral

## COMPOSICIÓN

1 tableta recubierta contiene:

240,0 mg de extracto metanólico de fruto de cardo mariano seco (Silybum marianum (L.) Gaertner), correspondientes a 150 mg de silimarina (calculada como silibinina) Excipientes c.s.p.

## USO TRADICIONAL RECOMENDADO:

Coadyuvante en el tratamiento de hepatitis crónica o aguda, además de cirrosis inducida por alcohol, medicamentos y toxinas.

## CONTRAINDICACIONES

No se debe tomar Lagosa® si se conoce hipersensibilidad a frutos de cardo mariano y/ u otros componentes (Asteraceae) o algún otro componente de Lagosa®.

## PRECAUCIONES

**Consideraciones de precaución a tener en cuenta**  
Los daños y afecciones del hígado también pueden tener otras causas, por lo que debe consultar con su terapeuta en caso de molestias de importancia.

### Consideraciones durante el embarazo y la lactancia

Debido a la ausencia de información disponible, Lagosa® no debe tomarse durante el embarazo ni la lactancia. No existen estudios adecuados para el uso de Lagosa® en niños. Por lo que Lagosa® no debe ser usado en niños menores de 12 años.

### Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No se requieren medidas de precaución adicionales.

## ADVERTENCIAS

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia de lactosa o mal absorción de glucosa – galactosa no deben tomar Lagosa®.

Lagosa® contiene lactosa. Si usted sabe que sufre de intolerancia a ciertos azúcares tome Lagosa® solo luego de consultar a su médico.

Contactar al médico si se sospecha haber tomado una sobredosis de Lagosa®.

La farmacoterapia no reemplaza la prevención de las causas de daño hepático (alcohol) Se debe contactar con el médico en casos de ictericia (decoloración en la piel a amarillo oscuro, coloración amarilla de la parte blanca de los ojos).

### Si toma menos Lagosa® del que debería u olvidó tomarlo:

Continúe tomando Lagosa® igual que antes y a las horas habituales y recuerde tomar regularmente el producto en el futuro.

### Si interrumpe la frecuencia de toma o lo termina antes de tiempo:

Lagosa® debe tomarse con el máximo de regularidad posible. Si interrumpe la frecuencia de toma o desea terminarlo antes de tiempo, consulte previamente a su terapeuta.

Comunicar al médico si está tomando algún otro medicamento, incluido medicamentos obtenidos sin prescripción, no se puede excluir la interacción derivada de la metabolización de sustancias extrañas por parte del sistema enzimático hepático.

La fecha de caducidad aparece impresa en este envase. No siga utilizando Lagosa® después de la fecha indicada.

Sin gluten. Contiene lactosa. Manténgase alejado de los niños.

## INTERACCIONES

Estudios farmacológicos en humanos en interacciones con productos medicinales cuyo metabolismo primario es por medio de la isoenzima CYP3A4 y glicoproteína P, por ejemplo indinavir, metronidazol, han dado resultados contradictorios.

El efecto de otras isoenzimas del sistema citocromo P450 no pueden ser excluidas. No hay estudios con productos específicos. Por lo que se recomienda monitoreo adecuado cuando haya el uso concomitante con estos productos.



16031

### Otros medicamentos que influyen en el efecto de Lagosa®

No se conocen interacciones.

### Estimulantes, alimentos y bebidas a evitar

El alcohol tiene un efecto dañino para el hígado y por tanto debe evitarse por completo.

### INCOMPATIBILIDADES:

No se conocen.

### EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que otros productos medicinales Lagosa® puede tener reacciones adversas.

### Posibles efectos adversos durante la administración de Lagosa®

De forma esporádica puede producirse un efecto levemente laxante que puede corregirse mediante la reducción de la dosis o la interrupción del uso del producto. Reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo rash o disnea puede ocurrir muy raramente.

Si experimenta efectos adversos que no aparecen enumerados en este prospecto, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

### Medidas correctoras en caso de efectos adversos

En caso de aparición de diarreas, reduzca la dosis diaria o interrumpa el uso del producto.

### DOSIFICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

¡ Respete en todo momento las prescripciones de uso, dado que de lo contrario Lagosa® no producirá los efectos previstos!

Siga las instrucciones siguientes siempre y cuando su médico no haya prescrito otras instrucciones de administración de Lagosa®.

A menos que se prescriba de manera diferente, adultos y adolescentes de 12 años tomar 1 tableta recubierta dos veces al día con suficiente líquido (por ejemplo un vaso de agua). La tableta recubierta debe tomarse con suficiente líquido, antes o durante las comidas.

La prescripción del médico indicará la duración de la toma. Comunicarse con el médico si los síntomas persisten.

### TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS

Hasta el momento no se han observado síntomas de intoxicación. Las reacciones adversas descritas pueden ocurrir con mayor severidad.

No se conoce un antídoto específico. Se recomiendan medidas sintomáticas.

### CONSERVACIÓN

Almacénesse a temperatura no mayor de 30 °C. Protéjase del calor y la luz, si es posible dentro del cartón.

### VENTA SIN RECETA MÉDICA



16031

**Wörwag Pharma GmbH & Co. KG**  
**Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen**

VNr. 04-1121-00 / 601487 / PE



148 x 210 mm / 8pt / PC XXXXX / LC  
XXXXXXX

Customer: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG  
Product: Lagosa®  
Country: **Peru (PE)**  
Dimensions: 148 x 210 mm  
CMO: SwissCaps  
Colours: ■ Black  
Date: 08.07.2020 3 04-0720-00 JuS  
23.07.2020 1 04-0720-00 JuS  
20.05.2021 3 04-0720-00 TSp  
26.07.2021 1,7 04-0721-00 TSp  
11.11.2021 1,9 04-1121-00 TSp